
CHAMPS DE HURWITZ

par

Antoine Chambert-Loir

Résumé. — On construit les champs de Hurwitz et on en donne quelques propriétés, essentiellement contenues dans SGA 1. Quelques applications de nature arithmétique en sont déduites.

Abstract. — We propose a construction of Hurwitz stacks and give some properties of them, most of which are consequences of SGA 1. Some applications of arithmetic flavor are then deduced.

Table des matières

1. Introduction.....	1
2. Notations.....	3
3. Construction des champs de Hurwitz.....	4
4. Propriétés des champs de Hurwitz.....	10
5. À propos d'un théorème de S. Beckmann.....	12
Références.....	13

1. Introduction

Les *espaces de Hurwitz* sont, classiquement, des variétés analytiques complexes qui paramètrent, en un sens plus ou moins précis, les revêtements de la sphère de Riemann dont le degré et le nombre de points de ramification sont donnés, et dont la ramification est simple. Ils ont notamment permis

Classification mathématique par sujets (2000). — 14A20, 14D22, 14E20.

Mots clefs. — Spécialisation du groupe fondamental, espaces de Hurwitz, corps de définition, champ algébrique, théorème de Belyĭ.

d'établir de manière algébrique (Klein, Hurwitz) la connexité de l'espace de modules des courbes en caractéristique zéro, et même (Fulton, [14] en caractéristique positive, assez grande (voir aussi l'appendice de [17] qui fournit une démonstration algébrique du seul argument d'origine analytique de la démonstration de Deligne et Mumford). Leur construction était originellement par voie transcendante. En particulier, l'article [11] d'Emsalem construit effectivement ces espaces de Hurwitz en tant que variétés algébriques sur le corps des rationnels, mais la démarche qui y est suivie consiste à algébriser l'espace de Hurwitz défini de manière transcendante, puis à descendre son corps de définition de $\mathbf{C}$ à $\mathbf{Q}$, via la théorie de Weil. Cependant, dans l'article déjà cité de Fulton, ils sont construits de manière algébrique, en recourant à un théorème de Grothendieck concernant la *représentabilité des foncteurs non ramifiés*.

L'étude du problème inverse de Galois (construire des extensions régulières de $\mathbf{Q}(T)$ de groupe de Galois donné) les a remis au goût du jour il y a une vingtaine d'années (travaux de Fried, [13]) avec nécessairement un parfum arithmétique un peu plus poussé. Les notions de *corps de modules* ou de *corps de définition* d'une courbe algébrique (*resp.* d'un revêtement) étaient au centre d'un grand nombre de travaux. Outre bien sûr ceux concernant la rigidité, ou l'effervescence autour des dessins d'enfants, je pense surtout à un article de Beckmann ([3]) dont il sera question dans ce texte : elle y contrôle les places de ramification dans le corps des modules d'un revêtement ramifié de la droite projective. En revanche, il est bien connu qu'il est en général plus difficile de préciser un corps de définition.

Cette note tire en effet son origine (en 1995) de la constatation que le théorème principal de cet article *était* une conséquence relativement directe de la théorie de la spécialisation du groupe fondamental, telle qu'étudiée par Grothendieck et Mme Raynaud dans SGA 1 ([16], exposé XIII). Suite à des discussions avec Emsalem, cette approche a été effectivement décrite dans un article de ce dernier ([12]). Comme il est clair à quiconque a lu le dernier exposé de SGA 1, cette approche s'étend aux revêtements d'une variété algébrique lisse ramifiés le long d'un diviseur à croisements normaux stricts.

Peu après, j'ai réalisé qu'on pouvait en fait interpréter ce théorème comme un analogue du théorème de Chevalley-Weil pour ces espaces de Hurwitz. Tout le sel de l'histoire vient alors du parallélisme entre corps de définition/corps des modules et variété/champ algébrique.

Parallèlement à l'élaboration de cet article, l'importance des gerbes et de la cohomologie non abélienne dans ces questions a été remarquablement mise en valeur dans des travaux de Dèbes, Douai et Emsalem ([7], [8], [9], [10], [6]).

Dans le présent article, je construis des *champs de Hurwitz* dans une situation très générale. Leur existence en tant que champs algébriques d'Artin est assez facile. Le fait que ce soient des champs de Deligne-Mumford provient

essentiellement des propriétés de la spécialisation du groupe fondamental. Les espaces grossiers qui leur sont associés sont a priori des espaces algébriques, mais, miraculeusement, la finitude du groupe fondamental en fait des schémas. Faute d'avoir réalisé ce dernier point plus tôt (!), j'avais laissé cet article hiberner, certes un peu trop longtemps. Je montre pour finir comment retrouver effectivement le théorème de Beckmann mentionné plus haut dans le style Chevalley-Weil.

Notons aussi que les gerbes construites dans les articles de Dèbes, Douai, Emsalem, apparaissent alors (évidemment) comme les *gerbes résiduelles* du champ de Hurwitz en ses points algébriques.

Je ne peux terminer cette introduction sans mentionner un certain nombre de lacunes (sérieuses) de cette note :

- l'article [17] de Harris et Mumford, repris amplement par Mochizuki ([20]) introduit une compactification des espaces de Hurwitz. Ce dernier incorpore aussi des techniques logarithmiques. La thèse (apparemment non publiée) de Wewers propose aussi une construction (différente) des espaces de Hurwitz usuels.

Il n'en sera hélas pas question ici. On peut espérer que la théorie de la spécialisation du groupe fondamental en géométrie logarithmique récemment étudiée par Vidal, jointe aux méthodes de cette note permette de construire des « log-champs » qui ne sont sûrement pas sans rapport avec la compactification de Harris-Mumford.

- Je ne tiens pas compte des groupes d'inertie.
- la vertu essentielle des espaces de Hurwitz classiques est leur connexité (cf. [14]) ainsi qu'une note récente de Graber, Harris et Starr, [15]). En général, on ne peut probablement rien dire, mais je n'ai pas réfléchi au problème.
- en certaines caractéristiques, les champs de Hurwitz que je construis ne sont probablement pas raisonnables, et d'ailleurs, j'ignore largement ce qui se passe en ces caractéristiques. (C'est lié au fait qu'il y a souvent trop de p -revêtements en caractéristique p .) Par d'autres méthodes (espaces de modules des courbes stables), Abramovich et Oort ont défini dans [1] des compactifications des espaces de Hurwitz.

Je remercie Dèbes, Emsalem, Lochak et Pop de l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail.

2. Notations

2.1. — Nous utiliserons dans ce texte la théorie des champs algébriques, telle qu'elle est développée dans la monographie [19] de Laumon et Moret-Bailly.

Depuis la rédaction de cet ouvrage, on peut noter que le critère d'Artin d'algébricité d'un S -champ (corollaire 10.11 de *loc. cit.*) a été étendu par Conrad et de Jong du cas d'un schéma localement de type fini sur un corps ou sur un anneau de Dedekind excellent au cas d'un schéma excellent quelconque. Même si cette généralité est illusoire dans les applications que nous avons en vue, nous rédigerons cette note en tenant compte de cette amélioration.

2.2. — Soit S un schéma excellent.

On désigne par (Aff/S) la catégorie des schémas affines T munis d'un morphisme $T \rightarrow S$; cette catégorie est munie de la topologie *fppf*. Conformément aux conventions choisies dans [19], nous pourrions nous contenter de la topologie étale. D'après *loc. cit.*, (9.4), ça ne change rien.

Si X et T sont deux S -schémas, on désigne par X_T le T -schéma $X \times_S T$ (changement de base).

Si $Y \rightarrow X$ est un morphisme de schémas, on désigne par $\text{Aut}(Y/X)$ l'ensemble des X -automorphismes de Y .

Un *revêtement* d'un schéma X est un morphisme $Y \rightarrow X$ localement libre de type fini et surjectif.

3. Construction des champs de Hurwitz

3.1. — Soient S un schéma excellent, ainsi qu'un schéma X muni d'un morphisme projectif et plat $\pi : X \rightarrow S$ à fibres géométriques connexes et réduites. (Donc $\pi_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$, universellement.)

On s'intéresse à paramétrer les revêtements (localement libres de type fini, surjectifs) de X , vérifiant éventuellement certaines propriétés supplémentaires (ramification, degré, groupe d'automorphisme...).

Définition 3.2. — On définit une catégorie $\mathcal{H}(X/S)$ comme suit :

– ses objets sont les triplets (T, Y, f) , où $T \in \text{ob}(\text{Aff}/S)$, Y est un schéma et $f : Y \rightarrow X_T$ est un revêtement ;

– un morphisme de (T, Y, f) dans (T', Y', f') est un couple (h, η) , où $h : T \rightarrow T'$, $\eta : Y \rightarrow Y'$ sont deux morphismes de schémas tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\eta} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_T & \xrightarrow{\text{id}_X \times h} & X_{T'} \end{array}$$

est cartésien.

On munit cette catégorie du foncteur d'« oubli du revêtement » $\mathcal{H}(X/S) \rightarrow (\text{Aff}/S)$ qui associe à (T, Y, f) le schéma T .

Quand il ne pourra y avoir de confusion possible, on notera $\mathcal{H} = \mathcal{H}(X/S)$. Si T est un S -schéma, on notera aussi $\mathcal{H}_T$ la catégorie fibre en T (dont les objets sont les (T, Y, f) comme ci-dessus).

Lemme 3.3. — *La catégorie $\mathcal{H}(X/S)$ ainsi définie est un S -champ.*

Démonstration. — Il est immédiat sur la définition que $\mathcal{H}$ est un S -groupeoïde ([19], définition 2.1). Il y a alors deux points à vérifier :

- Soient $T \rightarrow S$ un schéma, $f_1 : Y_1 \rightarrow X_T$ et $f_2 : Y_2 \rightarrow X_T$ deux objets de $\mathcal{H}_T$. Alors, le foncteur $\mathbf{Isom}_T(Y_1, Y_2)$ est un faisceau sur T . C'est clair puisque premièrement, les isomorphismes dans $\mathcal{H}_T$ sont des morphismes de T -schémas et qu'un morphisme entre deux T -schémas se définit localement sur T ; deuxièmement, un tel morphisme qui est localement cartésien sur T l'est globalement.

- Si $T' \rightarrow T$ est un morphisme fppf, toute donnée de descente de T' à T dans $\mathcal{H}$ est effective. Soit en effet $f' : Y' \rightarrow X \times_T T'$ un objet de $\mathcal{H}_{T'}$, muni d'une donnée de descente de T' à T . Un morphisme fini étant affine, il résulte du théorème de descente de Grothendieck ([16], exp. VIII, th. 2.1) qu'il existe un objet canonique $f : Y \rightarrow X_T$ de $\mathcal{H}_T$ tel que $f \times_T T'$ soit isomorphe à f' . D'autre part, la propriété pour un morphisme d'être fini localement libre est locale pour la topologie fppf (*loc. cit.*, cor. 5.7). $\square$

3.4. — Introduisons maintenant diverses généralisations du champ $\mathcal{H}(X/S)$.

- Soit n un entier ≥ 1 ; la catégorie $\mathcal{H}^n(X/S)$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{H}$ formée des $(T, Y, f : Y \rightarrow X_T) \in \mathcal{H}_T$ tels que f soit de degré constant n .

- Soit U un ouvert de X schématiquement dense dans toute fibre de $X \rightarrow S$, si bien que pour tout schéma $T \rightarrow S$, $U \times_S T$ est schématiquement dense dans $X \times_S T$; la catégorie $\mathcal{H}^{U\text{-ét}}(X/S)$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{H}$ formée des $(T, Y, f) \in \mathcal{H}_T$ tels que f soit étale au-dessus de $U \times_S T$.

- La catégorie $\mathcal{H}^{\text{g-ét}}(X/S)$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{H}$ formée des $(T, Y, f) \in \mathcal{H}_T$ tels que l'ensemble des points de X_T au-dessus desquels f est étale soit un ouvert de X_T qui est schématiquement dense dans toute fibre de $X_T \rightarrow T$.

On peut aussi ajouter des structures supplémentaires aux revêtements, comme par exemple :

- Soit G un groupe fini; la catégorie $\mathcal{H}^G(X/S)$ a pour objets les $((T, Y, f), \varphi)$, où (T, Y, f) est un objet de $\mathcal{H}$ et $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(Y/X_T)^{\text{op}}$ est un anti-isomorphisme de G dans les automorphismes de Y/X_T . Les morphismes de la catégorie $\mathcal{H}^G$ sont les morphismes de la catégorie $\mathcal{H}$ qui commutent à l'action de φ .

– Si $Z \subset X$ est un sous-schéma tel que $\pi_* \mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_S$ universellement, et si n est un entier ≥ 1 , la catégorie $\mathcal{H}^{n, Z\text{-tr}}(X/S)$ a pour objets les $((T, Y, f), \sigma)$, où (T, Y, f) est un objet de $\mathcal{H}$ et σ est un isomorphisme $\{1, \dots, n\} \times Z_T \rightarrow f^{-1}(Z_T)$.

On définit d'autres catégories $\mathcal{H}^{n, U\text{-ét}}$, $\mathcal{H}^{G, U\text{-ét}}$, $\mathcal{H}^{n, U\text{-ét}, Z\text{-tr}}$, etc. qui consistent à imposer toutes les conditions et à adjoindre toutes les données indiquées en exposant, les morphismes étant bien sûr astreints à vérifier les compatibilités correspondantes. En outre, on dispose de foncteurs d'oubli naturels vers $\mathcal{H}(X/S)$ qui permettent d'identifier les catégories avec plusieurs conditions comme les produits fibrés des catégories correspondantes au-dessus de $\mathcal{H}$.

Dans les applications que nous avons en vue, X sera en outre lisse sur S et U sera le complémentaire d'un diviseur à croisements normaux relatif sur S . Le cas le plus simple, donnant lieu aux espaces de Hurwitz classiquement considérés, est obtenu pour S l'espace qui paramètre les familles de d points distincts de la droite projective sur $\mathbf{Q}$, $X = \mathbf{P}^1 \times S$, $D \subset X$ le diviseur de degré d universel (dont la restriction à $\mathbf{P}^1 \times \{s\}$ est le diviseur donné par le point s) et $U = X \setminus D$ l'ouvert complémentaire.

Lemme 3.5. — *Pour tout objet $(T, T, f : Y \rightarrow X_T)$ de $\mathcal{H}(X/S)$, le faisceau sur (Aff/T) donné par $T' \mapsto \text{Aut}(Y_{T'}/X_{T'})$ est représentable par un T -schéma affine de type fini.*

Démonstration. — Soit $\mathcal{E} = f_* \mathcal{O}_Y$ la $\mathcal{O}_{X_T}$ -algèbre localement libre de rang fini définissant Y (de sorte que $Y = \text{Spec}_{X_T} \mathcal{E}$). Il y a bijection entre $\text{Aut}(Y_{T'}/X_{T'})$ et les automorphismes de $\mathcal{E}_{T'}$ comme $\mathcal{O}_{X_{T'}}$ -algèbre, d'où un faisceau représentable par un sous-schéma fermé de $\mathbf{V}(\pi_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}))^2$. $\square$

Proposition 3.6. — *Toutes ces catégories introduites sont des S -champs. De plus, les 1-morphismes naturels*

$$\mathcal{H}^n(X/S) \rightarrow \mathcal{H}(X/S), \quad \mathcal{H}^{U\text{-ét}}(X/S) \rightarrow \mathcal{H}^{g\text{-ét}}(X/S) \rightarrow \mathcal{H}(X/S)$$

sont représentables par des immersions ouvertes. Les 1-morphismes

$$\mathcal{H}^G(X/S) \rightarrow \mathcal{H}(X/S) \quad (\text{resp. } \mathcal{H}^{Z\text{-triv}}(X/S) \rightarrow \mathcal{H}(X/S))$$

sont représentable affines, et le second est même un $\mathfrak{S}_n$ -torseur.

Démonstration. — Une sous-catégorie pleine d'un S -groupoïde en est automatiquement un, si bien que $\mathcal{H}^n$, $\mathcal{H}^{U\text{-ét}}$ et $\mathcal{H}^{g\text{-ét}}$ sont des S -groupoïdes. De même, pour ces S -groupoïdes, la propriété que le foncteur des isomorphismes entre deux objets soit un faisceau résulte de la propriété correspondante dans $\mathcal{H}(X/S)$.

D'autre part, les conditions imposées sont locales pour la topologie fppf, si bien que toute donnée de descente qui est déjà effective dans $\mathcal{H}(X/S)$ fournira un objet de la sous-catégorie, laquelle est ainsi un sous- S -champ.

Pour prouver que le 1-morphisme $\mathcal{H}^n \rightarrow \mathcal{H}$ est représentable par une immersion ouverte, il faut prouver que pour tout S -schéma T , et tout $Y \rightarrow X_T$, l'ensemble des $t \in T$ tels que $Y_t \rightarrow X_t$ est de degré n est ouvert dans T . Or, le degré d'un morphisme localement libre est localement constant si bien que $Y \rightarrow X_T$ est de degré n au-dessus d'une réunion de composantes connexes de X_T lesquelles sont de la forme X_{T_1} , pour T_1 une composante connexe de T , puisque $X \rightarrow S$ est à fibres géométriquement connexes.

De même, soit $f : Y \rightarrow X_T$ un revêtement. Soit $B \subset X_T$ son lieu de branchement, plus petit fermé de X_T tel que $f : Y \rightarrow X_T$ soit étale au-dessus de $X_T \setminus B$. Comme $\pi : X \rightarrow S$ est plat, la projection $\pi(X_T \setminus B)$ est un ouvert $T' \subset T$. C'est de plus le plus grand sous-schéma de T tel que $f : Y_{T'} \rightarrow X_{T'}$ est étale au-dessus d'un ouvert de $X_{T'}$ surjectif sur T' , et sa formation commute au changement de base. Par conséquent, $\mathcal{H}^{\text{g-ét}} \rightarrow \mathcal{H}$ est représentable par une immersion ouverte.

Finalement, soit $U \subset X$ un ouvert de X qui est dense dans toute fibre de $X \rightarrow S$ et montrons que $\mathcal{H}^{U\text{-ét}} \rightarrow \mathcal{H}$ est représentable par une immersion ouverte. Considérons donc $f : Y \rightarrow X_T$ un revêtement. Son lieu de branchement est un fermé $B \subset X_T$; l'intersection $B \cap (X_T \setminus U)$ est un fermé de X_T dont la projection dans T est fermée. Notant T' l'ouvert complémentaire, on constate que $f_{T'} : Y_{T'} \rightarrow X_{T'}$ est un objet de $\mathcal{H}^{U\text{-ét}}$ et T' est le plus grand sous-schéma de T qui vérifie cette propriété, d'où l'assertion.

Passons maintenant au champ $\mathcal{H}^G$. C'est tout d'abord bien un S -champ : il est déjà clair que c'est un S -groupoïde. De plus le préfaisceau des isomorphismes entre deux objets est un faisceau : étant donnés deux objets $(Y_1 \rightarrow X_T; \varphi_1)$ et $(Y_2 \rightarrow X_T; \varphi_2)$ de $\mathcal{H}_T^G$ et un morphisme fppf $T' \rightarrow T$, tout isomorphisme $\alpha : (Y_{1,T'} \rightarrow X_{T'}; \varphi_{1,T'}) \rightarrow (Y_{2,T'} \rightarrow X_{T'}; \varphi_{2,T'})$ dans $\mathcal{H}_{T'}^G$ descend en un isomorphisme dans $\mathcal{H}_T^G$ qui va nécessairement commuter aux actions de G via φ_1 et φ_2 . Finalement, montrons que toute donnée de descente est effective : une donnée de descente de T' à T sur un objet $(Y_{T'} \rightarrow X_{T'}; \varphi_{T'})$ de $\mathcal{H}_{T'}^G$ nous fournit tout d'abord un objet $Y \rightarrow X_T$ de $\mathcal{H}_T$ car $\mathcal{H}_T$ est un S -champ. On obtient une donnée de descente de T' à T sur les $\varphi_{T'}(g)$ qui est elle aussi effective, $\text{Aut}(Y/X_T)$ étant un T -schéma, d'où un anti-homomorphisme $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(Y/X_T)^{\text{op}}$ qui est, encore par descente, un anti-isomorphisme.

La représentabilité du 1-morphisme $\mathcal{H}^G \rightarrow \mathcal{H}$ résulte du fait que pour toute famille $(Y \rightarrow X_T) \in \mathcal{H}_T$, le foncteur des homomorphismes $T' \mapsto \text{Hom}(G_{T'} \rightarrow \text{Aut}(Y_{T'}/X_{T'}))$ est le foncteur des T -homomorphismes entre deux schémas affines sur T , et est donc représentable par un schéma affine affine sur T .

Enfin, montrons que $\mathcal{H}^{n, Z\text{-tr}}$ est un champ et que $\mathcal{H}^{n, Z\text{-tr}} \rightarrow \mathcal{H}$ est représentable, fini et plat. Qu'il soit un S -champ se prouve de manière analogue (mais plus simple) à $\mathcal{H}^G$. Quant à la représentabilité, si $Y \rightarrow X_T$ est un objet de $\mathcal{H}_T$, soit $\mathcal{E}$ la $\mathcal{O}_{X_T}$ -algèbre localement libre correspondant à Y . Les $\sigma : \{1, \dots, n\} \times Z_T \rightarrow f^{-1}(Z_T)$ s'identifient à des isomorphismes de $\mathcal{O}_{Z_T}$ -algèbres

$$\mathcal{E}|_{Z_T} \simeq \mathcal{O}_{Z_T}^{\oplus n},$$

donnée représentable par un torseur sous le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$, étant donné que $\pi_* \mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_S$ universellement. $\square$

Proposition 3.7. — *Soit $n \geq 1$ un entier. Le champ $\mathcal{H}^n(X/S)$ est un champ algébrique de type fini. Par conséquent, le champ $\mathcal{H}(X/S)$ et ses variantes introduites en (3.4) sont des champs algébriques localement de type fini.*

Démonstration. — Soit Fib_n le S -champ des faisceaux localement libres de rang n sur X . D'après le théorème 4.6.2.1 de [19], c'est un champ algébrique de type fini sur S . On dispose d'un 1-morphisme de S -champs $\mathcal{H}_n \rightarrow \text{Fib}_n$ qui associe au revêtement de degré n , $f : Y \rightarrow X_T$, le faisceau localement libre de rang n sur X_T qu'est $f_* \mathcal{O}_Y$.

Nous allons prouver que ce morphisme est représentable. Compte tenu du dictionnaire entre schémas affines sur X_T et $\mathcal{O}_{X_T}$ -algèbres quasi-cohérentes, cela revient à prouver qu'étant donné un faisceau $\mathcal{E}$, localement libre de rang n sur X_T , la catégorie formée des structures de $\mathcal{O}_{X_T}$ -algèbres sur $\mathcal{E}$ est représentable par un espace algébrique. Or, elle l'est même par un schéma ! Une structure de $\mathcal{O}_{X_T}$ algèbre sur $\mathcal{E}$ consiste en effet en :

- une unité, qui est une section ne s'annulant pas de $\pi_* \mathcal{E}$, représentée par l'ouvert complémentaire de la section nulle dans le T -fibré vectoriel $\mathbf{V}(\pi_* \mathcal{E}^\vee)$;
- une fois fixée l'unité, une loi de multiplication, astreinte aux compatibilités qui font de $\mathcal{E}$ une $\mathcal{O}_{X_T}$ -Algèbre, représentée par un fermé du T -fibré vectoriel $\mathbf{V}(\pi_* \text{Hom}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}, \mathcal{E})^\vee)$.

La réunion de ces deux conditions est ainsi représentable par un schéma quasi-projectif de type fini, d'où la proposition. $\square$

Proposition 3.8. — *On suppose que les fibres du morphisme $X \rightarrow S$ satisfont à la propriété (S₂) de Serre⁽¹⁾. Soient T un S -schéma, $x_1 = (f_1 : Y_1 \rightarrow X_T)$ et $x_2 = (f_2 : Y_2 \rightarrow X_T)$ deux objets de $\mathcal{H}_T^n$. Supposons qu'il existe un ouvert $U \subset X_T$ schématiquement dense dans toute fibre au-dessus de T tel que f_1 et f_2 soient étales au-dessus de U . Alors, le faisceau sur T donné par $\text{Isom}_T(x_1, x_2)$ est un schéma fini et non-ramifié sur T .*

⁽¹⁾En d'autres termes, le morphisme $X \rightarrow S$ est (S₂), cf. EGA 4, déf. 6.8.1.

Démonstration. — On peut bien sûr supposer que $T = S$. La représentabilité de ce faisceau est contenue dans la définition d'un champ algébrique, ainsi que le fait qu'il soit séparé et quasi-compact sur S . Nous avons déjà vu qu'il est affine (lemme 3.5). Montrons qu'il est propre et non ramifié.

Soient $Y_1 \rightarrow X$ et $Y_2 \rightarrow X$ les revêtements de degré n correspondant à x_1 et x_2 .

Prouvons que le faisceau des isomorphismes entre x_1 et x_2 est non ramifié. On peut pour cela supposer que $S = \operatorname{Spec} R$, $I \subset R$ est un idéal de R tel que $I^2 = 0$ et noter $S_0 = \operatorname{Spec}(R/I)$. Étant donné un isomorphisme $\alpha_0 : Y_{1,S_0} \rightarrow Y_{2,S_0}$ au-dessus de X_{S_0} , il faut montrer qu'il existe au plus un isomorphisme $\alpha : Y_1 \rightarrow Y_2$ au-dessus de X dont α_0 soit la restriction à S_0 .

La « remarquable équivalence de catégories » (EGA 4, th. 18.1.2) implique que la restriction de α à $f_1^{-1}(U)$ est uniquement déterminée par la restriction de α_0 à $f_1^{-1}(U)_{S_0}$. Comme U est schématiquement dense dans X , il existe au plus un isomorphisme $\alpha : Y_1 \rightarrow Y_2$ qui relève α_0 .

Prouvons qu'il est propre. On peut alors supposer que S est un trait de point générique η , de point fermé s . Si $\alpha_\eta : Y_{1,\eta} \rightarrow Y_{2,\eta}$ est un isomorphisme au-dessus de X_η , montrons qu'il existe un unique isomorphisme $\alpha : Y_1 \rightarrow Y_2$ dont la restriction à η soit α_η . On peut interpréter α_η comme une section du morphisme canonique $Y_1 \times_X Y_2 \rightarrow Y_1$ au-dessus de $Y_{1,\eta}$ qu'il faut étendre à Y_1 .

D'après le critère valuatif de propreté, il existe un ouvert $O_1 \subset Y_1$ dont le complémentaire est de codimension ≥ 2 et une section α_1 au-dessus de O_1 .

Le morphisme $Y_1 \times_X Y_2 \rightarrow Y_1$ est fini localement libre, défini par l'image réciproque $\mathcal{E}_2$ par $Y_1 \rightarrow X$ de l'algèbre finie localement libre qui définit Y_2 . La section α_1 correspond ainsi à une section de $\mathcal{E}_2$ au-dessus de O_1 . Comme Y_1 est (S_2) (le morphisme $Y_1 \rightarrow S$ est (S_2) et plat comme composé de morphismes (S_2) et plats, et S est (S_2) puisque c'est un anneau de valuation discrète, cf. EGA 4, prop. 6.8.3), cette section s'étend en une unique section de $\mathcal{E}_2$ au-dessus de Y_1 , d'où une section du morphisme $Y_1 \times_X Y_2 \rightarrow Y_1$, d'où finalement un unique X -morphisme $\alpha : Y_1 \rightarrow Y_2$ qui étend α_η .

En appliquant le même raisonnement à α_η^{-1} , puis à $\alpha_\eta \circ \alpha_\eta^{-1}$ et $\alpha_\eta^{-1} \circ \alpha_\eta$, on voit que α est un isomorphisme, comme il fallait démontrer. $\square$

Il résulte de la proposition précédente et des définitions le corollaire suivant :

Corollaire 3.9. — *Supposons que le morphisme $X \rightarrow S$ satisfait à la propriété (S_2) . Le morphisme diagonal $\mathcal{H}(X/S) \rightarrow \mathcal{H}(X/S) \times_S \mathcal{H}(X/S)$ est représentable, fini et non ramifié.*

Corollaire 3.10. — *Supposons que le morphisme $X \rightarrow S$ satisfait à la propriété (S_2) . Les champs $\mathcal{H}^n(X/S)$, $\mathcal{H}^{n,Z\text{-triv}}(X/S)$, $\mathcal{H}^{n,U\text{-ét}}(X/S)$, $\mathcal{H}^G(X/S)$ sont des champs de Deligne–Mumford de type fini. Le champ $\mathcal{H}(X/S)$ est un champ de Deligne–Mumford localement de type fini.*

Démonstration. — Rappelons qu'un champ de Deligne–Mumford est un champ algébrique $\mathcal{S}$ qui possède une présentation étale, c'est-à-dire tel qu'il existe un 1-morphisme $P \rightarrow \mathcal{S}$, étale, où P est un schéma.

C'est une conséquence de la prop. 3.7, du corollaire précédent et de [19], th. 8.1. $\square$

Remarque 3.11. — La théorie précédente s'étend *verbatim* au cas d'un espace algébrique X/S en remplaçant partout les schémas par des espaces algébriques. Les seuls problèmes proviennent de l'utilisation éventuelle de schémas de Hilbert (qui n'est un schéma que dans le cas projectif). Cependant, étant donné un espace algébrique propre, Artin construit dans [2] son « espace algébrique de Hilbert ». La même démonstration que dans le cas projectif implique alors que les fibrés vectoriels sur un espace algébrique propre sont classifiés par un champ algébrique.

Remarque 3.12. — Il faudrait aussi traiter un cas supplémentaire : celui où on fixe des conditions sur les groupes d'inertie. Ce sera essentiel au paragraphe suivant lorsqu'on voudra exprimer les propriétés des champs de Hurwitz qui résultent de SGA 1.

4. Propriétés des champs de Hurwitz

Dans tout ce paragraphe, nous supposons que X est lisse sur S et que $U \subset X$ est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux relatifs D . Cela signifie ([16], XIII, 2.1) que localement pour la topologie étale, $D \subset X$ est isomorphe à $\text{div}(x_1 \cdots x_r) \subset \mathbf{A}^n$.

Nous allons donner quelques propriétés des champs de Hurwitz en nous ramenant aux énoncés correspondants sur les revêtements ou sur les groupes fondamentaux démontrés dans [16]. Si $f : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ est un morphisme de schémas connexes « géométriquement pointés », rappelons que l'on a un homomorphisme $f_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, y)$ entre groupes fondamentaux et que :

- f_* est injectif si et seulement si tout revêtement étale connexe de X est une composante connexe de l'image réciproque par f d'un revêtement étale de Y ([16], V, 6.8) ;
- f_* est surjectif si et seulement si l'image réciproque par f de tout revêtement étale connexe de Y est connexe ([16], V, 6.9) ;
- f_* est un isomorphisme si et seulement si f induit par image réciproque une bijection entre les catégories des revêtements étales connexes de Y et de X (conséquence des deux points précédents, [16], V, 6.10).

Proposition 4.1. — *Le champ $\mathcal{H}^{U\text{-ét}}(X/S)$ est étale sur S aux points correspondant à des revêtements modérément ramifiés.*

Démonstration. — Comme $\mathcal{H}$ est localement de type fini sur S , il suffit de prouver qu'il est formellement étale aux points considérés. Autrement dit, si $S' \subset S$ un fermé défini par un idéal de carré nul et $Y' \rightarrow X_{S'}$ un revêtement de $X_{S'}$ non ramifié hors de $D_{S'}$ et modérément ramifié le long de $D_{S'}$, on doit prouver qu'il existe un unique revêtement $Y \rightarrow X$ non ramifié hors de D tel que $Y_{S'} = Y'$.

Or, c'est une conséquence du *lemme d'Abhyankar relatif* ([16], XIII, 5.5), de l'énoncé analogue pour les revêtements étales ([16], ??) et de la théorie de la descente. $\square$

Si N est un entier, $S[1/N]$ désigne le plus grand ouvert de S où N est inversible.

Proposition 4.2. — *Le champ $\mathcal{H}^{G,U-\text{ét}}(X/S)$ est propre et quasi-fini au dessus de $S[1/\#G]$. Le champ $\mathcal{H}^{n,U-\text{ét}}(X/S) \times_S S[1/n!]$ est propre et quasi-fini au-dessus de $S[1/n!]$.*

Démonstration. — Posons $N \# G$ dans le premier cas et $N = n!$ dans le second. Une fois établie l'assertion relative à la propreté, l'autre découle de la proposition précédente : un S -champ de Deligne-Mumford qui est propre et étale est en effet quasi-fini, comme on le voit sur une présentation étale.

Le critère valuatif de propreté pour les champs de Deligne-Mumford ([19], prop. 7.12⁽²⁾) nous ramène à établir le fait suivant : supposons que $S = \text{Spec } R$ est le spectre d'un anneau de valuation discrète, de corps résiduel k de caractéristique p ne divisant pas N et de corps des fractions K , alors tout revêtement galoisien de groupe G (resp. de degré n) de X_K se prolonge en un unique revêtement de X qui est galoisien de groupe G (resp. de degré n).

Dans le premier cas, cela résulte de ce que le morphisme canonique entre les plus grands quotients d'ordres premier à p des groupes fondamentaux $\pi_1(X_K)^{(p)} \rightarrow \pi_1(X)^{(p)}$ est injectif. Sa bijectivité résulte en fait de [16], XIII, 2.8 (cf. *loc. cit.*, preuve de 2.12, page 394).

Dans le second cas, l'ordre du groupe de Galois de la clôture galoisienne d'un tel revêtement divise $n!$, ce qui nous ramène au cas déjà traité. $\square$

Corollaire 4.3. — *Les champs de Hurwitz $\mathcal{H}^{G,U-\text{ét}}(X/S)$, $\mathcal{H}^{n,U-\text{ét}}$ que nous avons introduits possèdent des espaces grossiers en tant qu'espaces algébriques. Leur restriction au plus grand ouvert tel que $\#G$ (resp. $n!$) est inversible est un schéma fini étale.*

Démonstration. — D'après un théorème de Keel et Mori ([18], cor. 1.3; voir aussi [19], th. 19.1), tout champ algébrique de type fini et séparé possède un espace grossier associé dans la catégorie des espaces algébriques.

⁽²⁾La condition (*) de *loc. cit.* est vérifiée car les champs considérés sont de Deligne-Mumford, cf. *loc. cit.*, remarques 7.12.2 et 7.12.3.

Notons ainsi avec des lettres romaines les S -espaces algébriques grossiers des champs de Hurwitz. Il résulte de la proposition 4.2, que $H^{G,U\text{-ét}}(X/S)$ (*resp.* $H^{n,U\text{-ét}}(X/S)$) est propre et quasi-fini au-dessus de $S[1/N]$, où $N = \#G$ (*resp.* $N = n!$). La proposition est alors une conséquence immédiate de ce qu'un espace algébrique quasi-fini au-dessus d'un schéma est un schéma ([19], th. A.2 et cor. A.2.1). $\square$

Bien sûr, dans les cas où le problème de modules considéré n'a pas d'automorphisme non trivial, la proposition précédente montre que le champ de Hurwitz est un schéma fini étale au-dessus d'un ouvert convenable de S . C'est notamment le cas du champ $\mathcal{H}^G(X/S)$, lorsque le centre du groupe fini G est trivial.

5. À propos d'un théorème de S. Beckmann

5.1. — Soit S un schéma et soit $\mathcal{X}$ un S -champ algébrique localement noethérien. Rappelons ([19], chap. 5 et 11) qu'un point (automatiquement « algébrique », en vertu de *loc. cit.*, th. 11.3) de X est une classe d'équivalence de couples (x, K) , où K est un S -corps⁽³⁾ et x un morphisme de S -champs, $\text{Spec } K \rightarrow \mathcal{X}$. On dit que deux couples (x_1, K_1) et (x_2, K_2) sont équivalents s'il existe un couple (x, K) , où K est un sur- S -corps de K_1 et K_2 et $x = x_1 \otimes_{K_1} K = x_2 \otimes_{K_2} K$.

Un tel point ξ se factorise canoniquement à travers un sous- S -champ $\mathcal{G}_\xi$ de $\mathcal{X}$ qui est une gerbe de type fini sur son faisceau grossier, lequel est de la forme $\text{Spec } \kappa(\xi)$, pour un certain corps $\kappa(\xi)$ appelé *corps résiduel du point* ξ .

On voit ainsi que, dans le langage des espaces de modules, le corps résiduel d'un point n'est autre que le *corps des modules* de l'objet représenté.

Nous pouvons maintenant énoncer l'analogie pour les champs algébriques d'un théorème de Chevalley et Weil :

Proposition 5.2. — *Soit S un schéma normal, intègre, de corps des fractions K . Soit $\mathcal{X}$ un S -champ de Deligne-Mumford qui est propre et étale sur S . Alors, le corps résiduel de tout point algébrique du K -champ $\mathcal{X}_K$ est non ramifié sur S .*

Démonstration. — Pour la démonstration, on peut supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète.

Soit X l'espace algébrique grossier associé à $\mathcal{X}$. D'après les arguments du cor. 4.3, c'est en fait un S -schéma. La factorisation $\mathcal{X} \rightarrow X \rightarrow S$ et le fait que $\mathcal{X}$ soit propre et étale impliquent que X est fini et étale sur S .

⁽³⁾Un S -corps est un corps K muni d'un morphisme de $\text{Spec } K$ vers S .

Soit ξ un point de $\mathcal{X}$. Son image dans X définit un $\kappa(\xi)$ -point x d'un S -schéma fini et étale, où le corps résiduel de ξ , $\kappa(\xi)$, est une extension finie de K . Soit R la clôture intégrale de S dans $\kappa(\xi)$. D'après le critère valuatif de propreté, x se prolonge en une section $\text{Spec } R \rightarrow X$ dont l'image est nécessairement étale sur S . Autrement dit, $\kappa(\xi)$ n'est pas ramifiée sur K . $\square$

Une première conséquence de ces considérations est une généralisation d'un théorème de S. Beckmann [3] concernant le corps des modules d'un revêtement ramifié de la droite projective.

Théorème 5.3. — *Soit S un schéma normal, intègre, de corps des fractions K ; soit X un S -schéma lisse, D un diviseur à croisements normaux relatif dans X . Soit G un groupe fini (resp. soit n un entier) ; on suppose que le cardinal de G (resp. $n!$) est inversible sur S .*

Alors, le corps des modules d'un revêtement (a priori défini sur une extension finie de K) galoisien de groupe G (resp. d'un revêtement de degré n) de X , non ramifié hors de D , est non ramifié sur S .

Démonstration. — Il suffit d'appliquer le théorème de Chevalley-Weil (prop. 5.2) au champ de Hurwitz adéquat $(\mathcal{H}^{G,X} \setminus D\text{-ét}(X/S), \text{resp. } \mathcal{H}^{n,X} \setminus D\text{-ét}(X/S))$ et au point fourni par le revêtement. $\square$

Notons que dans un autre article ([4]), Beckmann a établi un théorème qui concerne cette fois la ramification de l'extension de corps de nombres fournie par la fibre d'un tel revêtement. Une version plus faible découle du théorème de Chevalley-Weil appliqué au revêtement lui-même. Notons aussi que Conrad a généraliser ce second théorème dans [5] au cas de la dimension supérieure. Il serait probablement intéressant d'interpréter ce résultat dans le cadre de la géométrie logarithmique.

Références

- [1] D. ABRAMOVICH & F. OORT — « Stable maps and Hurwitz schemes in mixed characteristics », in *Advances in algebraic geometry motivated by physics (Lowell, MA, 2000)*, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2001, p. 89–100.
- [2] M. ARTIN — « Algebraization of formal moduli, I », in *Global analysis (Papers in honor of K. Kodaira)*, 1969, p. 21–71.
- [3] S. BECKMANN — « Ramified primes in the field of moduli of branched coverings of curves », *J. Algebra* **125** (1989), p. 236–255.
- [4] ———, « On extensions of number fields obtained by specializing branched coverings », *J. Reine Angew. Math.* **419** (1991), p. 27–53.
- [5] B. CONRAD — « Inertia groups and fibers », *J. Reine Angew. Math.* **522** (2000), p. 1–26, Erratum : vol. **533** (2001), p. 235–236.

- [6] P. DÈBES, J.-C. DOUAI & M. EMSALEM – « Families de Hurwitz et cohomologie non abélienne », *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* **50** (2000), no. 1, p. 113–149.
- [7] P. DÈBES & J.-C. DOUAI – « Algebraic covers : field of moduli versus field of definition », *Ann. Sci. École Norm. Sup.* **30** (1997), no. 3, p. 303–338.
- [8] ———, « Local-global principles for algebraic covers », *Israel J. Math.* **103** (1998), p. 237–257.
- [9] ———, « Gerbes and covers », *Comm. Algebra* **27** (1999), no. 2, p. 577–594.
- [10] P. DÈBES & M. EMSALEM – « On fields of moduli of curves », *J. Algebra* **211** (1999), no. 1, p. 42–56.
- [11] M. EMSALEM – « Familles de revêtements de la droite projective », *Bull. Soc. Math. France* **123** (1995), p. 47–85.
- [12] ———, « On reduction of covers of arithmetic surfaces », in *Applications of curves over finite fields (Seattle, WA, 1997)*, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999, p. 117–132.
- [13] M. FRIED – « Fields of definition of function fields and Hurwitz families—groups as Galois groups », *Comm. Algebra* **5** (1977), no. 1, p. 17–82.
- [14] W. FULTON – « Hurwitz schemes and irreducibility of moduli of algebraic curves », *Ann. of Math.* (1969), p. 542–575.
- [15] T. GRABER, J. HARRIS & J. STARR – « A note on Hurwitz schemes of covers of a positive genus curve », [arXiv:math.AG/0205056](https://arxiv.org/abs/math/0205056).
- [16] A. GROTHENDIECK – *Revêtements étales et groupe fondamental*, Lecture Notes in Math., no. 224, Springer Verlag, 1971, SGA 1.
- [17] J. HARRIS & D. MUMFORD – « On the Kodaira dimension of the moduli space of curves », *Invent. Math.* **67** (1982), no. 1, p. 23–88, With an appendix by William Fulton.
- [18] S. KEEL & S. MORI – « Quotients by groupoids », *Ann. of Math.* **145** (1997), no. 1, p. 193–213.
- [19] G. LAUMON & L. MORET-BAILLY – *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 39, Springer Verlag, 2000.
- [20] S. MOCHIZUKI – « The geometry of the compactification of the Hurwitz scheme », *Publ. RIMS. Kyoto Univ.* **31** (1995), no. 3, p. 355–441.